CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 29 - 83 -10789 Chișinău 27 octombrie 2025

Oficiilor teritoriale
ale Cancelariei de Stat

În contextul demersului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr.05-5603 din 17.10.2025), privind demararea in perioada 20.102025 - 02.11.2025 a campaniei de vaccinare manuală antirabică a vulpilor, rugăm diseminarea informației prezentate către autoritățile administrației publice locale din teritoriul administrat.

Anexă: 7 file.

Secretar general adjunct al Guvernului */semnat electronic/* **Tatiana CUCUIETU**

Digitally signed by Cucuietu Tatiana
Date: 2025.10.27 13:59:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ex. V. Grigoraș
Tel. 022 250359

Casa Guvernului,
MD-2012, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 104

E-mail:
cancelaria@gov.md

OFICIUL TERITORIAL BĂLȚI AL CANCELARIEI DE STAT
Nr. de intrare 360
Indexul 1303 / OT
"27" 10 2025

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
MD-2009, str. M. Kogălniceanu, 63, mun. Chișinău
Republica Moldova
Tel/fax. (+373 22) 26-46-40, 29-47-30
e-mail: info@ansa.gov.md, www.ansa.gov.md

NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
MD-2009, str. M. Kogălniceanu, 63, Chisinau,
Republic of Moldova
Tel/fax. (+373 22) 26-46-40, 29-47-30
e-mail: info@ansa.gov.md, www.ansa.gov.md

Nr. 05-5603 din "17" 10.2025

La nr._____ din "____"_____

Cancelaria de Stat

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Ministerul Mediului

Ministerul Sănătății

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Apărării

Agenția Moldsilva

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Sănătate Publică

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor

Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Moldova

Prin prezenta, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare Agenția), Vă informează despre demararea, în perioada 20.10.2025 – 02.11.2025, a campaniei de vaccinare manuală antirabică a vulpilor, scopul căreia este implementarea Hotărârii Guvernului nr.174/2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de prevenire și control al rabiei la animale.

Principalul obiectiv al Programului este diminuarea progresivă a rabiei în Republica Moldova, dar și fructificarea oportunității țării de a absorbi fondurile financiare acordate de Uniunea Europeană pentru eradicarea rabiei prin Decizia Grant SANTE/VP/2018/RO/SI2.774145, decizie care prevede și acordarea asistenței financiare nerambursabile pentru Republica Moldova, destinate finanțării măsurilor de profilaxie a rabiei la vulpile sălbatice. Programul în cauză este sprijinit de România și cofinanțat de Uniunea Europeană.

În acest an, din cauza războiului ce a cauzat nesiguranța spațiului aerian, vaccinarea vulpilor contra rabiei se va desfășura prin distribuție manuală și doar în raioanele cu risc sporit al focarelor de rabie precum: Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Drochia, Rîșcani, Florești, Soroca, Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Fălești, Glodeni, Chișinău, Strășeni, Ialoveni, Criuleni, Dubăsari, Cimișlia, Basarabeasca, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Taraclia, Ungheni, Nisporeni, Călărași., începând cu data de 20 octombrie și până în data de 02 noiembrie 2025 (care se poate prelungi în dependență de condițiile de mediu).

Distribuția manuală a momelilor vaccinale se va realiza de către personalul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției, și în acest scop, solicităm respectuos suportul personalului din cadrul Agenției Moldsilva și a Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, fapt ce va facilita eficiența plasării momelelor în teren.

Menționăm că urmează a fi utilizate momeli vaccinale „RABADROP", produse de către Bioveta, Cehia (prospectul acestuia se anexează).

Anexat:5 (cinci) file.

Director general **Radu MUSTEAȚA**

Ex: V. Oancea
Tel.: 022-264-671

Anexa nr. 2

APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

RABADROP
suspensie orală

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bioveta a.s., Komenskeho 212/12
68323 Ivanovice na Hane
Republica Cehă
Tel. 00420 517 318 500; Fax 00420517 318 653
Email: comm@bioveta.cz

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

RABADROP, suspensie orală

1 doză (1,8 ml) conţine:
Substanţa activă:
Virus rabic atenuat tulpina de tip SAD Clone - min 1,8 x $10^{6,0}$ $TCID_{50}$* – max. 1,8 x $10^{8,5}$ $TCID_{50}$*
*doza infectantă de culturi celulare – 50%

Excipienţi:
Mediu stabilizator (colagen, clorură de sodiu, trometamol, glutamat de potasiu, acid edetic, apă pentru preparate injectabile).

Materialul momelii
Momeala nr. 1:
Seu bovin, parafină solidă, ulei de parafină, făină de peşte, biomarker - clorhidrat de tetraciclină.

Momeala nr. 2:
Ulei de palmier, făină de peşte, parafină solidă, bergafat, biomarker - clorhidrat de tetraciclină.

APROBAT

Momeala nr. 3:
Seu bovin, ulei de palmier, făină de pește, parafină solidă, bergafat, biomarker - clorhidrat de tetraciclină.

Biomarker-ul poate să nu fie parte din componența momelii, dacă astfel solicită condițiile speciale ale unei licitații. Lipsa biomarker-ului nu are acțiune negativă asupra acceptabilității momelilor.

Momeala este de culoare maro-verde până la maro, formă cubică sau rotundă, cu o consistență solidă. Înăuntrul momelii se află un blister din plastic cu inscripție în mai multe limbi „Atenție – vaccin împotriva rabiei". Conținutul blisterului (tulpina vaccinală cu mediu stabilizator) este o suspensie de culoare portocalie până la roșie-violet.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE
Pentru imunizarea activă a vulpilor roșii și a câinilor enot cu scopul prevenirii infecției cu virusul rabic.
Durata imunității: cel puțin 12 luni.

4. CONTRAINDICAȚII
Nu există.

5. REACȚII ADVERSE
Nu au fost observate reacții adverse.
Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.
Ca alternativă, puteți raporta prin sistemul național de raportare.

6. SPECII ȚINTĂ
Vulpea roșie (*Vulpes vulpes*), câine enot (*Nyctereutes procyonoides*).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ
Administrarea orală.

Momelile sunt distribuite fie manual sau pe cale aeriană, în cadrul campaniilor de vaccinare împotriva rabiei. De obicei momelile de formă cubică sunt utilizate pentru distribuția aeriană. Momelile sunt destinate ingerării de către vulpi sau câini enot. Ingerarea unei singure momeli este suficientă pentru a asigura imunizarea activă împotriva rabiei.

Vaccinarea concretă depinde de condițiile locale, îndeosebi de densitatea populației speciilor țintă în zona respectivă, de starea sănătății (de ex. incidența rabiei în populația speciilor țintă) și alte cerințe asociate campaniei de vaccinare.

Zona de vaccinare trebuie să fie cât mai largă posibil (de preferință peste 5000 km^2). Campaniile de vaccinare în zonele libere de rabie trebuie planificate astfel încât să acopere o centură de 50 km în fața zonei în care s-a depistat rabia.
Rata de distribuție depinde de topografie, de densitatea populației de animale din specia țintă și de situația epizootologică.
De aceea trebuie respectate recomandările Autorității competente stabilite în mod corespunzător cu privire la rata de distribuție, zona de vaccinare, metoda de distribuție a momelilor și alte condiții locale/zonale.
O densitate mai mare de distribuție se recomandă în zonele cu o densitate crescută a populației de vulpi/câini enot. Distribuția aeriană a momelilor prin orice dispozitive adecvate de zbor (ex. avioane, elicoptere, drone etc.) este recomandată pentru spațiile deschise sau foarte puțin populate, iar distribuția manuală este recomandată în zonele cu densitate crescută a populației umane.
Distribuția aeriană a momelilor nu este recomandată în apropierea apelor (cum ar fi lacuri, râuri, rezervoare de apă) și în zone dens populate.
Pentru a proteja regiunile libere de rabie, vaccinarea poate fi efectuată în scopul creării unei centuri de vaccinare sau sub formă de vaccinare locală. Vaccinarea trebuie efectuată de două ori pe an, timp de câțiva ani consecutiv, cel puțin doi ani după ultimul caz confirmat de rabie în regiune.
Vaccinarea însă nu trebuie efectuată în cazul în care temperaturile ating și depășesc 30°C.
O stabilitate mai înaltă la temperaturile ridicate ale mediului înconjurător are, mai ales, momeala nr. 3.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE
Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
A se păstra și transporta în condiții de congelare la temperaturi de -20°C și mai joase.
În cazul în care vaccinul este decongelat în perioada sa de valabilitate, însă nu mai târziu de a 21-a luna de valabilitate, vaccinul poate fi depozitat și utilizat timp de 90 de zile după decongelare, păstrat între +2°C și +8°C.
A nu recongela.
Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data de expirare înscrisă pe etichetă (după EXP).

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu derivat dintr-un astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11 ATENȚIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:
Nu există.

AFROBAT

Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Nu plasați momelile în zonele locuite, în zona drumurilor și în apropierea cursurilor de apă (cum ar fi lacuri, râuri, lacuri de acumulare).
Acest vaccin nu este destinat pentru vaccinarea animalelor domestice.
Datorită materialului nedigerabil al blisterului pot apărea tulburări gastrointestinale.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Vaccinul conține microorganisme vii atenuate, prin urmare ar trebui luate măsuri adecvate pentru a evita contaminarea persoanei care manipulează vaccinul și a colaboratorilor săi, de exemplu, purtând îmbrăcăminte sau mănuși de protecție adecvate la manipularea și distribuirea vaccinului.
În cazul contactului accidental al omului cu substanța activă a vaccinului, clătiți imediat locul afectat cu apă și săpun, solicitați imediat asistența medicală și prezentați medicului prospectul sau eticheta medicamentului.
Măsurile de prim ajutor propuse imediat după expunerea directă a omului la lichidul vaccinal trebuie să fie în conformitate cu recomandările OMS precizate în „Ghidul OMS pentru profilaxia pre- și post-expunere a rabiei (PEP) la oameni".

Gestație și lactație:
Nu a fost stabilită siguranța medicamentului de uz veterinar în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune:
Nu se cunosc.

Supradozaj (simptome, proceduri de urgență, antidoturi):
Administrarea virusului vaccinal la o doză de 10 ori mai mare decât cea recomandată la speciile țintă și alte specii de animale (de exemplu, pisică, rozătoare etc.) nu a indus reacții adverse.

Incompatibilități:
Nu sunt disponibile studii de compatibilitate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani la temperaturi de -20°C și mai joase.
În cazul în care vaccinul este decongelat în perioada sa de valabilitate, însă nu mai târziu de a 21-a lună de valabilitate, vaccinul poate fi depozitat și utilizat timp de 90 de zile după decongelare, păstrat între +2°C și +8°C.
Stabilitatea momelii în condiții de laborator este de 7 zile la +25°C, 5 zile la +30°C și 3 zile la +35°C.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează în baza prescripției veterinare.

APROBAT

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

O doză vaccinală este conţinută în blistere de aluminiu/PVC, acoperite cu momeală.

Dimensiunea ambalajului:

a) Pentru distribuţie manuală

Vaccinul este ambalat în cutie de carton cu o grilă de fixare a câte 20 unităţi momeli.
Ambaljul grupat în cutii de carton este de 30 x 20 unităţi momeli.

SAU

Vaccinul este ambalat în pungi de plastic a câte 30 unităţi momeli.

b) Pentru distribuţie aeriană

Momelile vaccinale sunt ambalate în pungi sau manşoane din plastic plasate în cutii de carton a câte 700 unităţi momeli (1 x 700 unităţi momeli în cazul manşoanelor din plastic sau 2 x 350 unităţi momeli în cazul pungilor din plastic).

Fiecare ambalaj conţine prospect aprobat.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

07/2022

Pentru orice informaţii despre acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR